



“No fue fácil escuchar sobre esto, pero me alegro de haber recibido tratamiento de inmediato.”

Obtenga más información sobre la gonorrea:

- Llame gratis al 1-800-232-4636
- O visite www.ashstd.org

Gonorrea:

Lo que debe hacer ahora

Su pareja sexual tiene gonorrea (go-no-RRE-a).

Esta es una infección curable que las personas pueden contraer al tener relaciones sexuales. Usted también puede tener gonorrea.

Su pareja ha tomado medicamentos para curar la gonorrea. Usted también debe ser visto y examinado por un médico para detectar infecciones de transmisión sexual (ITS) y debe tomar un medicamento para tratar la gonorrea tan pronto como pueda.

Esto es lo que necesita saber:

- La gonorrea es fácil de curar. Pero tanto usted como su(s) pareja(s) debe(n) tomar el medicamento según lo indicado.
- Puede contraer gonorrea al tener relaciones sexuales con el pene, la vagina o el ano. También puede contraerla teniendo sexo oral (boca en el pene, la vagina o el ano).
- La mayoría de las personas con gonorrea no tiene ningún signo o síntoma.
- Algunas personas tienen ardor al orinar (hacer pipí); secreción de la vagina, el pene o el ano; sangrado anal o dolor pélvico.
- Si no recibe tratamiento, puede enfermarse gravemente o es posible que no pueda tener hijos.
- Para las personas que no reciben tratamiento y luego quedan embarazadas, la gonorrea puede causarle daño a su bebé.

Reciba tratamiento

Su pareja puede traerle pastillas o una receta para obtener un tratamiento adecuado. De cualquier manera, es importante tomarlas como se indica tan pronto como sea posible.



Cualquier persona que aparezca en estas fotos es un modelo. Las fotos se utilizan solo con fines ilustrativos.

Así es como se toman las pastillas:

Cefixima (800 mg): Tome todo el medicamento en una sola dosis con agua, tan pronto como lo reciba.

- NO comparta ni le dé estas pastillas a nadie más.

La mayoría de las personas no tienen efectos secundarios graves después de tomar estas pastillas.

- Algunas personas pueden sentirse mareadas o tener malestar estomacal/diarrea.

Estos son problemas comunes que desaparecerán por sí solos en un par de días. Si no desaparecen, hable con su médico. También hable con su médico si tiene picazón o secreción de la vagina.

Las pastillas son muy seguras para la mayoría de las personas.

Hable con su médico antes de tomar el medicamento si:

- Ha tenido alguna vez una mala reacción, sarpullido o alergia a los antibióticos.
- Tiene una enfermedad grave, como enfermedad renal, cardíaca o hepática.
- Actualmente está tomando otro medicamento recetado.
- Está o puede estar embarazada.
- Está amamantando.

En estos casos, es importante hablar con su médico de inmediato sobre lo que debe hacer.

Si le practicó sexo oral a alguien que estaba infectado con gonorrea, es posible que el medicamento no funcione tan bien. Debería consultar a un médico para obtener un medicamento más fuerte.

¿Cuánto tiempo tarda en desaparecer la infección?

Se tarda 7 días. Para la semana después de tomar las pastillas:

- Es mejor no tener sexo en absoluto con la vagina, el pene, la boca o el ano.
- Si tiene relaciones sexuales, debe usar un condón o de lo contrario podría contraer gonorrea nuevamente.

Vaya a un médico, clínica o sala de emergencias de inmediato si:

- Está vomitando (devolviendo).
- Tiene dolor en la parte baja del vientre o dolor al tener relaciones sexuales.
- Tiene sibilancias/dificultades para respirar.
- Tiene sarpullido o fiebre.
- Tiene dolor o hinchazón en los testículos (huevos).
- Tiene dolor intenso en las articulaciones.

Esto puede significar que puede necesitar un medicamento más fuerte o que está teniendo una reacción alérgica a su antibiótico.

Hágase una prueba de gonorrea ahora.

- La prueba no duele; solo tiene que orinar (hacer pipí) en un recipiente. También hay una prueba de hisopado que puede usar usted mismo.
- Cualquier persona con la que haya tenido relaciones sexuales en los últimos 60 días también debe hacerse la prueba.
- Si es positivo, hágase otra prueba en 3 meses para asegurarse de que no volvió a contraer gonorrea.

Encuentre una clínica cerca de usted:

- Pregúntele a su pareja dónde se hizo la prueba o llame a la línea directa de los CDC al 800-CDC-INFO o al 800-232-4636.
- Hágase la prueba de otras ITS, incluidas la sífilis y el VIH.
- Protéjase del VIH con PrEP (profilaxis previa a la exposición), una pastilla diaria que le ayuda a mantenerse VIH negativo.