



聽到這個消息，
心裡很不舒服，
但我很高興
我得到了及時的
治療。

欲瞭解更多
衣原體：

- 撥打免費電話
1-800-232-4636
- 或者瀏覽
www.ashastd.org

衣原體：

您現在應該做些什麼

您的性伴侶患有衣原體 (klay-MID-ee-a)。
人們可以透過性生活感染衣原體。
您也可能有衣原體。

您的性伴侶已經服藥來治療衣原體。
您必須儘快服用同一種藥物進行治療。

您需要知道以下這幾點：

- 衣原體是容易治癒的。但是您和您的性伴侶（們）**必須**馬上服用所有的藥片。
- 您可以透過陰莖，陰道或肛門進行性生活而感染衣原體。您也可以透過口交（嘴巴放在陰莖或陰道口。）而被感染。
- 很多人都有衣原體，但是他們自己不知道這一點。
- 有些人會感到痛或有分泌物（有液體滴出來）。
- 如果您沒有得到治療，病情會變得嚴重。或者您有可能永遠不能有孩子。
- 對於那些沒有得到治療，隨後又懷孕的婦女，衣原體會傷害他們的嬰兒。

服用您的性伴侶 為您帶回來的藥片。

您的性伴侶可能會為您帶回藥片或處方去配藥。無論哪種方式，重要的是您要儘快服用這些藥物。



在這些照片中所顯示的人是一個典範。
照片僅用於說明之用。

以下是如何服用這些藥物：

- 用裝滿一玻璃杯的水，把所有的藥片同時服下。
- 在服用藥物的前一小時或兩小時後不要服用制酸劑（如 Tums 或 Rolaids）。
- 不要把這些藥片與其他人共用或給予其他人！

大多數人在服用這些藥片後都沒有問題。

- 有些人可能會感到頭暈或胃部不適或腹瀉。
- 有些婦女可能有瘙癢和有分泌物從陰道流出來。

這些常見的問題幾天後會自行消失。如果不消失，跟您的醫生談談。

對於大多數人來說，藥片是非常安全的。

跟您的醫生談談，您需要做些什麼：

- 如果您曾經有不良反應、皮疹或對抗生素過敏。
- 如果您患有嚴重的疾病，如腎臟、心臟或肝臟疾病。
- 如果您正在服用任何處方藥物。

感染要多久才會消失？

需要 7 天。

您服用這些藥片之後的 7 天：

- **絕對不要**透過陰道、陰莖、嘴巴或肛門進行性生活。
- 但是，如果您確實有性生活，則必須使用避孕套，否則您將會再次得到衣原體感染的危險。

馬上往看醫生、診所、或急診室：

如果您是一位女性，而且：

- 下腹疼痛。
- 性生活時有疼痛。
- 嘔吐。
- 有皮疹或發燒。

如果您是一位男性，而且：

- 您的睪丸（球）有疼痛或腫脹。
- 有皮疹或發燒。

這可能意味著您也許需要更強的藥物。那些給您的藥物可能不足以治癒感染。

現在就進行衣原體測試。

- 測試不會受到傷害。您只需要在杯子裡小便。
- 任何在過去 60 天內曾與您有性生活的人也應該進行測試。
- 3 個月內再進行一次測試，以確保您沒有得到衣原體。

查找您附近的診所：

- 詢問您的性伴侶，他或她的測試是在哪裡進行的。
- 瀏覽 www.teensource.org。點擊關於“找到一家診所”，並輸入您的郵遞區號。
- 致電疾病預防控制中心熱線 800-CDC-INFO 或 800-232-4636。