



No fue fácil enterarme de esto, pero estoy feliz de haber recibido tratamiento inmediato.

Aprenda más sobre la gonorrea:

- Llame gratis al 1-800-232-4636
- O visite [www.ashastd.org](http://www.ashastd.org)



# Gonorrea:

## Lo Que Debe Hacer Ya

Su pareja sexual tiene gonorrea (go-no-RRE-a). Esta es una infección que las personas pueden contraer al tener relaciones sexuales. Usted puede tener gonorrea también.

Su pareja ha tomado medicamentos para curar la gonorrea. Usted debe tomar el mismo tipo de medicamento lo más pronto posible.

### Esto es lo que usted debe saber:

- La gonorrea es fácil de curar.
- Usted puede contraer gonorrea al tener relaciones sexuales con el pene, la vagina o el ano. También puede contraerlo por tener sexo oral (boca en el pene o la vagina).
- Muchas personas tienen gonorrea y no lo saben.
- Algunas personas tienen dolor, una sensación de ardor cuando orinan o una secreción (goteo).
- Si no recibe tratamiento, puede llegar a estar muy enfermo. O es posible que no pueda tener hijos nunca.
- Para las mujeres que no reciben tratamiento y posteriormente quedan embarazadas, la gonorrea puede hacer daño a su bebé.

### Obtenga Tratamiento

- La mejor manera de librarse de esta infección es ir a una clínica inmediatamente.
- Si no puede ver a un médico en los próximos días, tome el medicamento que le trajo su pareja o llene la receta.
- Debido a que la gente puede tener más de una ETS (enfermedad de transmisión sexual) al mismo tiempo, es importante que usted visite una clínica tan pronto como sea posible para hacerse la prueba para otras ETS.



Cualquier persona que se muestra en estas fotos es modelo. Las fotos se utilizan sólo con fines ilustrativos.

## Así es como se deben tomar las pastillas:

### Cefixima (400 mg)

Tómese toda esta medicina en cuanto la reciba. Y también deben haberle dado:

### Azitromicina (1 gramo)

Tómese toda esta medicina en cuanto la reciba.

- NO tome antiácidos (como Tums o Rolaids) durante una hora antes o dos horas después de tomar las píldoras.
- ¡NO comparta o de estas pastillas a nadie!

La mayoría de la gente no tiene problemas después de tomar estas píldoras.

- Algunas personas pueden sentir mareo o tener malestar estomacal o diarrea.
- Algunas mujeres pueden tener comezón y secreción de la vagina. Estos problemas comunes desaparecerán por su cuenta en un par de días. Si no desaparecen, hable con su médico.

## Las pastillas son muy seguras para la mayoría de la gente.

Sin embargo, NO tome el medicamento si:

- Si alguna vez ha tenido una mala reacción, erupción, problemas de respiración o reacción alérgica después de tomar cualquier antibiótico. Las personas que son alérgicas a algunos antibióticos pueden ser alérgicas a otros tipos. Si usted tiene alergias a los antibióticos, debe consultar con su médico antes de tomar este medicamento.
- Si usted tiene problemas crónicos tales como enfermedad renal, del corazón o hígado.
- Si usted está tomando actualmente otro medicamento recetado, incluyendo medicina para la diabetes.

En estos casos es importante que usted consulte con su médico inmediatamente acerca de lo que usted debe hacer.

Si usted ha realizado sexo oral con alguien que estaba infectado con gonorrea, el medicamento puede no funcionar tan bien. Usted debe ver a un médico para obtener un medicamento más fuerte.

Si usted está embarazada, es seguro tomar las pastillas, pero usted aun debe realizarse un examen completo.

## ¿Cuánto tiempo se necesita para que la infección desaparezca?

Se toma 7 días.

Por 7 días después de tomar las pastillas:

- **Lo mejor es no tener relaciones sexuales en absoluto** con la vagina, pene, boca, o el ano.
- Sin embargo, si usted tiene relaciones sexuales, debe usar un condón o de lo contrario estará en peligro de contraer gonorrea de nuevo.

## Vaya inmediatamente con un médico, clínica o sala de emergencias si usted está:

- Resollando
- Teniendo problemas para respirar
- Vomitando
- Tiene fiebre

## Consulte a un médico o clínica si tiene:

- Erupción en parte o en todo su cuerpo
- Si tiene una o más articulaciones hinchadas o dolorosas

Si usted es un hombre y:

- Tiene inflamación o dolor en sus testículos (bolas).
- Esto puede significar que usted puede necesitar medicamentos más fuertes. El medicamento que se le ha dado PUEDE NO SER suficiente para curar la infección.

## Hágase una prueba de gonorrea ahora.

- La prueba no duele. Usted sólo tiene que orinar (hacer pipí) en una taza.
- Un hisopo de la vagina también se puede utilizar para la prueba de algunas enfermedades de transmisión sexual. Usted puede hacerlo usted misma, y enviarlo de vuelta a la clínica para obtener resultados de su prueba.
- Cualquier persona con quien haya tenido relaciones sexuales en los últimos 60 días también debe hacerse la prueba.

- Hágase otra prueba en 3 meses para asegurarse de que usted no contrajo la gonorrea de nuevo.

## Encuentre una clínica cercana a usted:

- Pregunte a su pareja donde él o ella se examinaron.
- Visite [www.teensource.org](http://www.teensource.org), siga a "find a clinic" y entre su código postal (zip).
- Llame a la línea de 24 horas de CDC al 800-CDC-INFO o al 800-232-4636.