



Fue duro enterarme de esto, pero me alegro de haber recibido tratamiento inmediato.

Aprenda más sobre la tricomoniasis:

- Llame gratis al 1-800-232-4636
- O visite www.ashastd.org



Tricomoniasis:

Lo Que Debe Hacer Ya

Su pareja sexual tiene tricomoniasis (tri-co-mo-NIA-sis).

Esta es una infección curable que la gente puede contraer al tener relaciones sexuales. Usted puede tener tricomoniasis también.


Su pareja ha tomado medicamentos para tratar la tricomoniasis. Usted debe tomar el mismo tipo de medicamento lo más pronto posible.

Esto es lo que usted debe saber:

- La tricomoniasis es fácil de curar. Pero tanto usted como su pareja (s) deben tomar todos sus medicamentos inmediatamente.
- Usted puede contraer tricomoniasis al tener relaciones sexuales (sexo vaginal, sexo oral, o el uso de juguetes sexuales).
- Muchas personas tienen tricomoniasis y no lo saben.
- Los hombres con tricomoniasis pueden tener dolor en el pene, una sensación de ardor al orinar, o una secreción del pene. Las mujeres pueden tener una irritación o una secreción maloliente de la vagina.
- Si una mujer no recibe tratamiento y posteriormente queda embarazada, la tricomoniasis puede afectar su embarazo y podría causar que su bebé nazca antes de tiempo.

Tome las pastillas que su pareja le trae.

- Su pareja puede traerle pastillas o una receta para obtenerlas. De cualquier manera, es importante que las tome lo más pronto posible.
- Usted también puede visitar una clínica tan pronto como sea posible y recibir tratamiento.



Cualquier persona que se muestra en estas fotos es modelo. Las fotos se utilizan sólo con fines ilustrativos.

Aquí está la manera de tomar las píldoras:

Usted recibirá 4 pastillas blancas de metronidazol (500 mg cada una).

Tome todas las 4 pastillas al mismo tiempo con un vaso lleno de agua.

- NO consuma alcohol durante 24 horas después de tomar este medicamento. Puede causar que usted enferme gravemente.
- NO tome antiácidos (como Zantac o Pepcid) durante una hora antes o dos horas después de tomar las píldoras.
- NO comparta ni dé sus pastillas a nadie más.

La mayoría de la gente no tiene problemas graves después de tomar estas pastillas.

- Algunas personas pueden tener un malestar estomacal, náuseas, vómitos o diarrea.
- Algunas personas también pueden notar un oscurecimiento de la orina.

Estos problemas comunes desaparecerán por su cuenta en un par de días. Si no desaparecen o si se desarrolla una erupción o fiebre, consulte a un médico.

Estas pastillas son muy seguras para la mayoría de la gente.

Sin embargo, NO tome las pastillas y hable con un médico o proveedor PRIMERO si:

- Sabe que está embarazada, piensa que puede estar embarazada o planea quedar embarazada.
- Alguna vez ha tenido una mala reacción, sarpullido, o alergia a los antibióticos.

- Tiene un padecimiento grave como enfermedad renal, del corazón o hígado.
- Está tomando cualquier otro medicamento prescrito.

¿Cuánto tiempo se necesita para que la infección desaparezca?

La medicina tarda 7 días en surtir efecto.

Por 7 días después de tomar las pastillas:

- Lo mejor es no tener relaciones sexuales en absoluto (sexo vaginal, sexo oral, sexo anal, o usar juguetes sexuales).
- Si usted tiene relaciones sexuales, debe usar un condón o de lo contrario estará en peligro de contraer tricomoniasis de nuevo o pasar la infección a su pareja (s).

Acuda a un médico, clínica o sala de emergencias de inmediato:

Si usted es mujer y:

- Tiene dolor en el bajo vientre.
- Tiene dolor durante las relaciones sexuales.
- Está vomitando.
- Tiene una erupción o fiebre.

Si usted es un hombre y:

- Tiene dolor o inflamación en los testículos.
- Tiene una erupción o fiebre.

Esto puede significar que usted puede necesitar medicamentos más fuertes. El medicamento que se le ha dado PUEDE NO SER suficiente para curar la infección.

Hágase la prueba para la tricomoniasis hoy.

- La prueba no duele.
- Un médico o enfermera pueden necesitar tomar una sencilla muestra de líquido de la vagina.
- Hágase otra prueba en 3 meses para asegurarse de que usted no contrajo la tricomoniasis de nuevo.

Encuentre una clínica cercana a usted:

- Pregúntele a su pareja donde él o ella se examinó.
- Visite www.bedsider.org, siga a “where to get it” y entre su ciudad, estado o código postal (zip).
- Llame a la línea de 24 horas de CDC al 800-CDC-INFO o al 800-232-4636.